



rok na zahradě

■ Připravuje Specializovaná prodejna Zahrádkář v České ulici 167, Louny

■ Škůdci česneku

✿ Hádátka zhoubné
Pokud listy česneku žloutnou, krní, deformují se, může to působit hádátka zhoubné. Je průsvitné, tenoučké a viditelné lupou (1 mm). Přezimuje v česneku, hostitelských rostlinách (cibuloviny, kořenová i plodová zelenina, plevele) a v půdě záhonu vydrží i roky. Do rostlin proniká průduchy, ranami a pomocí speciálního ústního bodce a enzymů. Rádo napadá kořenové podpučí. Do roka se v rostlinách líhne několik generací, svědčí jim vlhko a těžké půdy.
Hádátka zhoubné je karantén- ní škůdce. Jeho zjištění je třeba ohlásit na obecním úřadě nebo pobočce Státní rostlinolékař- ské správy, kde odborníci určí postup hospodaření na zamo- řeném pozemku. Prevencí je pěstování registrované sadby, osevní postup (česnek nikdy nesázíme po sobě na stejné místo), chemicky lze stroužky mořit přípravkem Sulka. Postří- ky za vegetace nejsou účinné.

✿ Houbomilka česneková
Malé mušky kladou brzy z ja- ra vajíčka na listy vzcházejícího



česneku těsně nad zemí. Larvy vyžírají základy listů, vegeta- ční vrchol. V napadené rostlině je vždy jen jedna larva. Žír způsobuje kroucení a žloutnutí listů a jejich zahnívání. Příz- na- ky jsou podobné hádátce, ale muší larva je dobře viditelná (1 cm). Kuklí se v půdě blízko rostlin a v květnu až červnu se líhne nová generace, která přezimují. Houbomilka špatně létá, proto se doporučuje česnek pěstovat co nejdále od loňského záhonu. U podzimních odrůd se osvědčuje nejlépe už na podzim překrývání bílou netkanou tex- tilii.
Houbomilkou nebývá napa- den česnek z jarní výsadby, který je v době náletu houbo- milky hluboko pod zemí. Pro podzimní odrůdy je na chemic- kou ochranu nejvyšší čas! Pro- vádí se po 4 slunečných dnech s teplotou okolo 10 °C, postřík se po 14 dnech opakuje. Při ošetření po prvních příznacích musíme počítat, že rostliny již byly poškozeny a musí zrege- nerovat. Sklizeň bude menší, skladovatelnost horší.

✿ Další škůdci
Česneku škodí i květilka ci- bulová, vrtalka pórová a molík česnekový. Napadení těmito škůdci lze také s hádátkem zaměnit, k náletům prvních generací ale dochází později (duben, květen), a proto se příznaky napadení projevují později a ne tak kalamitně.
S přáním mnoha zahrádkář- ských úspěchů
Otakar Parma ml.

STAVEBNINY

KB BLOK

PŘIJME

PRO SVOJI PRODEJNU V LOUNECH

VEDOUCÍHO PRODEJNY

požadované vzdělání: ÚSO odborné s maturitou, praxe v oboru, ŘP skupiny B
možný nástup: IHNED

- K přijímacímu pohovoru je třeba předložit:*
- * maturitní vysvědčení
 - * OP, životopis s uvedením předchozích zaměstnání
 - * popř. další vysvědčení o kvalifikaci

SKLADNÍKA - ŘIDIČE VZV

požadované vzdělání: praxe v oboru
možný nástup: IHNED

- K přijímacímu pohovoru je třeba předložit:*
- * OP, životopis s uvedením předchozích zaměstnání
 - * popř. další vysvědčení o kvalifikaci

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU S HYDRAULICKOU RUKOU

požadované vzdělání: praxe v oboru, řidičský průkaz skupiny C a E
možný nástup: IHNED

- K přijímacímu pohovoru je třeba předložit:*
- * ŘP
 - * OP, životopis s uvedením předchozích zaměstnání
 - * popř. další vysvědčení o kvalifikaci

Nabídky na zaměstnání zasílejte na ředitelství společnosti na adresu:
KB - BLOK systém, s.r.o., ul. Masarykova čp. 635
439 42 Postoloprty - prům. zóna
nebo na e-mail: info@kb-blok.cz,
popř. faxem na číslo 415 784 531

Dymnivka plná - prstnatá, nový druh Džbánska

Vyjdete-li si v dubnu nebo v květnu do lužního lesa k řece Ohři, udiví vás záplava krásných červeně-růžových a bílých kvetoucích rostlin, kterým se lidově říká „slepičky“, botanicky dymnivky. Drobné kvítky také připomínají květy příbuzného zeměděly a mají s ním příbuzné i jméno (dymnivka-zeměděly). V zemi mají dymnivky hlízy, podle kterých se od sebe rozeznávají jednotlivé druhy.
Dymnivky zásadně provázejí východním Džbánu je to např. luhy nebo bažantnice s bohatou Mšecká bažantnice. Překvapilo humózní a vlhkou půdou. Ve mne, že jsem se s dymnivkou

setkal i na Podlesí. Nikoliv u potoka, ale na hraně opukové skály Čertovky v okolí známého hradiště Dřevíč.
Povšiml jsem si, že tu rostou společně dva druhy dymnivek. Mezi velkými dymnivkami dutými se ojediněle vyskytují nápadně menší dymnivky s natěsnaným hroznem prohnutých kvítků. Při

utržení rostlinky a při prohlídce listnatého květenství jsem zjistil, že tu jsou zásadní morfologické změny, zejména pokud jde o tvar palistů pod kvítky. Dymnivka dutá má palisty pod květy podlouhle vejčité, celokrajné a nedělené.
Odlišný druh má však všechny palisty v nahloučeném hroznu

široce prstnatě dělené. Při studiu a konfrontaci přírodního materiálu jsem dospěl k názoru, že jde o dymnivku plnou - prstnatou, která na Džbánu dosud uváděna nebyla. Je potěšitelné, že i nyní lze nalézt nový rostlinný druh. V Přírodním parku Džbán je nález o to radostnější.
Josef Houda